

Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (24 câu – 6.0 điểm)

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40N/m gắn một quả nặng khối lượng 100g. Hệ sẽ dao động điều hoà với tần số góc là:

- A. $\omega = 20\text{Hz}$ B. $\omega = 2\text{rad/s}$ C. $\omega = 20\text{rad/s}$ D. $\omega = 1,58\text{rad/s}$

Câu 2: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là l , đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g thì tần số góc được tính bằng:

- A. $\omega = \sqrt{\frac{g}{\Delta l}}$ B. $\omega = \sqrt{\frac{l}{g}}$ C. $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ D. $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

Câu 3: Một vật dao động điều hoà theo phương trình $x = 2\cos(10\pi t + \frac{\pi}{3})\text{(cm)}$. Chu kỳ của dao động là:

- A. $T=0,2\text{ (s)}$ B. $T=10\pi\text{ (s)}$ C. $T=5\text{ (s)}$ D. $T=10\text{ (s)}$

Câu 4: Một vật dao động điều hoà có tần số góc 10 rad/s, biên độ 0,1m. Tốc độ của vật khi nó cách vị trí cân bằng 8 cm là

- A. 6 m/s B. 8 m/s C. 80 cm/s D. 60 cm/s

Câu 5: Dao động tắt dần là dao động có đặc điểm:

- A. Có biên độ giảm dần theo thời gian, cơ năng bảo toàn.
B. Có biên độ và cơ năng giảm dần theo thời gian.
C. Có biên độ không đổi, cơ năng giảm dần theo thời gian.
D. Có biên độ tăng rồi giảm dần theo thời gian.

Câu 6: Dao động điều hoà của một vật có phương trình $x = 5\cos(20t + \frac{\pi}{2})\text{(cm)}$. Tốc độ cực đại của vật là:

- A. $V_{\max} = 10\text{ (m/s)}$ B. $V_{\max} = 100\text{ (m/s)}$ C. $V_{\max} = 1\text{ (m/s)}$ D. $V_{\max} = \pi\text{(m/s)}$

Câu 7: Một con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ được coi là dao động điều hoà, chiều dài dây treo: 50cm, gia tốc rơi trọng trường tại nơi đặt con lắc: $9,87\text{m/s}^2$. Chu kỳ dao động của con lắc là:

- A. $T=1,41\text{s}$ B. $T=4,44\text{s}$ C. $T=44,72\text{s}$ D. $T=1,13\text{s}$

Câu 8: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng $m=500\text{g}$ dao động điều hoà với chu kỳ 1 (s), (cho $\pi^2=10$). Độ cứng của lò xo là:

- A. $k=20\text{N/m}$ B. $k=5\text{N/m}$ C. $k=10\text{N/m}$ D. $k=2\text{N/m}$

Câu 9: Hai dao động điều hoà: $x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$ và $x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$. Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi:

- A. $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$ B. $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$ C. $\varphi_2 - \varphi_1 = \pi/4$ D. $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi/2$

Câu 10: Phát biểu nào sau đây **không đúng**? Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là

- A. Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng
B. Biên độ của dao động cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng
C. Chu kỳ của lực cưỡng bức bằng chu kỳ của dao động riêng
D. Tần số góc của lực cưỡng bức bằng tần số góc dao động riêng

Câu 11: Con lắc đơn có chiều dài dây treo l , đặt nơi có gia tốc trọng trường g , đang dao động điều hoà với biên độ góc 4° thì tần số dao động là 2Hz; Nếu tăng biên độ góc của dao động đến 8° thì tần số dao động mới của con lắc là:

- A. $f=4\text{Hz}$ B. $f=1\text{Hz}$ C. $f=8\text{Hz}$ D. $f=2\text{Hz}$

Câu 12: Con lắc lò xo dao động điều hoà, gồm lò xo có độ cứng $k=80\text{N/m}$, chiều dài quỹ đạo là 20cm. Năng lượng của dao động là:

- A. $W=0,4\text{J}$ B. $W=0,8\text{J}$ C. $W=1,6\text{J}$ D. $W=3,2\text{J}$

Câu 13: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình:

$x_1 = 5\cos(2\pi t + \pi/4)\text{ (cm)}$ và $x_2 = 5\sqrt{2}\cos(2\pi t - \pi/2)\text{ (cm)}$. phương trình của dao động tổng hợp là:

A. $x=10\cos(2\pi t-\pi/4)$ (cm)

B. $x=5\cos(2\pi t-\pi/4)$ (cm)

C. $x=5\sqrt{2}\cos(2\pi t+3\pi/4)$ (cm)

D. $x=5\cos(2\pi t+\pi/4)$ (cm)

Câu 14: Một con lắc lò xo, gồm lò xo có độ cứng k và gắn vào quả cầu khối lượng m , công thức đúng xác định tần số của hệ:

A. $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$

B. $f = \frac{1}{2} \pi \sqrt{\frac{k}{m}}$

C. $f = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

D. $f = 2\pi \sqrt{\frac{k}{m}}$

Câu 15: Một con lắc lò xo dao động điều hoà có thời gian ngắn nhất khi chuyển động từ vị trí biên này sang biên kia là 0,25s, lò xo có độ cứng $k = 100$ N/m, khối lượng vật nặng có giá trị (cho $\pi^2=10$):

A. $m=625$ g

B. $m=1,25$ kg

C. $m=2,5$ kg

D. $m=156,25$ g

Câu 16: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể có giá trị nào trong các giá trị sau:

A. $A=15$ cm

B. $A=10$ cm

C. $A=0,5$ cm

D. $A=1$ cm

Câu 17: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình: $x = 10\cos(8\pi t + \pi)$ (cm). Lực kéo về tại thời điểm $t=0,5$ s có độ lớn là bao nhiêu, biết độ cứng của lò xo là 20N/m.

A. $F=0,2$ N

B. $F=2$ N

C. $F=20$ N

D. $F=0,02$ N

Câu 18: Trong phương trình dao động điều hoà: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$, đại lượng ω là:

A. Chu kì

B. Tần số

C. Tần số góc

D. Pha dao động

Câu 19: Nhận xét nào sau đây không đúng

A. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức

B. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản môi trường càng lớn

C. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức

D. Dao động duy trì có chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng của con lắc

Câu 20: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình: $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ và $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$, công thức tính biên độ dao động tổng hợp là:

A. $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 + \varphi_1)$

B. $A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$

C. $A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 + \varphi_1)$

D. $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$

Câu 21: Một vật dao động điều hoà có quỹ đạo dài 24cm, biên độ dao động của vật:

A. 48cm

B. 24cm

C. 6cm

D. 12cm

Câu 22: Một con lắc lò xo dao động điều hoà, khi giảm khối lượng m của vật đi 4 lần nhưng giữ nguyên độ cứng k của lò xo thì chu kì dao động của con lắc là:

A. Tăng 4 lần

B. Giảm 4 lần

C. Giảm 2 lần

D. Tăng 2 lần

Câu 23: Một con lắc đơn có dây treo dài 50cm và vật nặng khối lượng 1kg, dao động với biên độ góc 0,1 rad tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 10$ m/s². Năng lượng dao động toàn phần của con lắc bằng:

A. $W=0,012$ J

B. $W=0,25$ J

C. $W=2,5$ J

D. $W=0,025$ J

Câu 24: Phương trình tọa độ của một chất điểm M có dạng: $x = 5\cos(4\pi t + \frac{\pi}{3})$ (cm). Vận tốc của vật ở thời điểm $t=2$ s có giá trị:

A. $V=20$ (cm/s)

B. $V=20\pi$ (cm/s)

C. $V=-10\pi\sqrt{3}$ (cm/s)

D. $V=10\pi\sqrt{3}$ (cm/s)

PHẦN II. TỰ LUẬN (4 câu – 4.0 điểm)

Câu 1. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng $m=500$ g dao động điều hòa với chu kỳ 1 (s), (cho $\pi^2=10$). Tính độ cứng của lò xo.

Câu 2. Con lắc lò xo dao động điều hoà, gồm lò xo có độ cứng $k=80$ N/m, chiều dài quỹ đạo là 20cm. Tính năng lượng của dao động.

Câu 3. Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x = 2\cos(10\pi t + \frac{\pi}{3})$ (cm). Tính chu kì của dao động.

Câu 4. Dao động điều hòa của một vật có phương trình $x = 5\cos(20t + \frac{\pi}{2})$ (cm). Tính tốc độ cực đại của vật.

HẾT