

Câu 1: Nhiệt độ úm cho gà thịt cuối tuần thứ nhất ?



A. 29 °C.



B. 31 °C.



C. 33 °C.



D. 35 °C.



Hết rồi ..Bạc chọn rồi !



Làm lại



Đáp án



Câu 2: Nhiệt độ úm cho gà thịt cuối tuần thứ hai ?



A. $31^{\circ}\text{C} - 29^{\circ}\text{C}$.



B. $33^{\circ}\text{C} - 31^{\circ}\text{C}$.



C. $35^{\circ}\text{C} - 33^{\circ}\text{C}$.



D. $37^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$.



Hết rồi ..Bạc cho nó úm rồi !



Làm lại



Đáp án





Câu 3: Nuôi gà lấy trứng từ 8 đến 13 tuần cho ăn thực phẩm:



A. 16% - 17% đạm.



B. 14% - 15% đạm.



C. 19% - 120% đạm.



D. 13% - 14% đạm.



Hết rồi ..Bạc chọn đúng rồi !



Làm lại



Đáp án





Câu 4: Nhiệt độ úm gà con từ 1 đến 4 tuần tuổi phù hợp khi quan sát gà thấy:



A. Gà con tránh xa nguồn nhiệt.



B. Gà con tụm lại gần nguồn nhiệt.



C. Gà con di chuyển về một phía.



D. Gà con rải rác đều trong chuồng.



**Hết rồi !
Đáp án đúng rồi !**



Làm lại Đáp án



BÀI 6: PHƯƠNG PHÁP NUÔI GÀ ĐẼ

I CÁCH CHỌN GÀ TRÊN CÁ THỂ:

1. Chọn từng thời điểm:

- Gà con nhanh nhẹn, lanh lợi, không dị tật.
- Trong quá trình nuôi, cân 1 lần để loại những gà bệnh, không qui định.
- Khi gà đẻ rồi cứ 3 tháng loại 1 lần đối với những con đẻ ít.

2. Các đặc điểm lưu ý với gà mái đẻ:

- Gà mái mau lớn đạt yêu cầu của giống.
 - Lông mượt, mỏng mềm, đỏ tươi, hông rộng, bụng to mềm.
 - Xương hậu môn và xương ức cách nhau 6cm (4 ngón tay để ngang).
- 2 xương hậu môn cách nhau ít nhất 3cm (2 ngón tay để ngang).

- Khi gà đẻ da vàng ở hậu môn, mỏ và chân nhạt.
- Gà thay lông thì ngưng đẻ hay đẻ ít, gà khỏe thay lông mau (gà thay lông nhanh chậm cần căn cứ vào 10 lông cánh ngoài cùng. Lông này thay dần từ trong ra ngoài, gà tốt 1 tuần thay 2 – 3 lông, gà xấu 2 – 3 tuần mới thay 2 đến 3 lông).

II. CÁCH NUÔI DƯỠNG:

1. Các hình thức nuôi gà đẻ.

- Gà trứng ấp nuôi thả chuồng nền để gà hoạt động khỏe mạnh, chắc chắn; mật độ 5 con/ 1m².
- Gà trứng thương phẩm: Nuôi chuồng lồng, mỗi ngăn có kích thước 40cm x 40cm x 40cm/ 3 gà.

2. Cách chăm sóc.

- Đủ ánh sáng, thoáng mát, sạch sẽ.
- Cho ăn thức ăn gà đẻ: 16% đạm.
- Máng ăn 10cm/ con cho ăn từ 5 giờ sáng đến 21g.
- Cắt mỏ gà để tránh cắn mổ nhau và bớt rơi vãi thức ăn (cắt lúc 6 đến 8 tuần tuổi hoặc trước khi đẻ 140 – 160 ngày).
- Cách 3 tháng tái chủng vaccine Newcastle M.

III. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GÀ ĐẼ:

1 Khí hậu:

- Nhiệt độ lớn hơn 32°C hay dưới 20°C đều ảnh hưởng đến năng suất trứng và sức khỏe của gà (nhiệt độ 25°C đến 28°C thích hợp).
- Mưa tạt gió lùa làm gà bị bệnh.
- Chuồng đủ ánh sáng để gà tổng hợp sinh tố D cho cơ thể, giúp chuồng khô ráo, sát trùng chuồng.
- Độ ẩm thích hợp là 70% - 80%.

2. Mật độ:

- Dày quá gà dễ bị bệnh.
- Thưa quá tốn kém.

3. Chăm sóc:

- Chăm sóc tốt, đầy đủ dinh dưỡng gà khỏe mạnh tỉ lệ đẻ cao và ngược lại.

IV. LỊCH CHỦNG NGỪA:



Ngày tháng tuổi	Loại vaccine	Cách chủng
A. Gà con, gà thịt		
1 ngày	Masek	Chích bắp
3 ngày	Newcastle F	Nhỏ mắt, mũi
7 – 10 ngày	Trái	Chích da, cánh
10 – 14 ngày	Gumboso	Nhỏ mắt, mũi
21 ngày	Newcastle F	Nhỏ mắt, mũi
30 ngày	Gumboso	Nhỏ mắt, mũi

B. Gà đẻ thương phẩm		
2 tháng		Chích dưới da
2 tháng 7 ngày	Tụ huyết trùng	Chích dưới da
2 tháng 15 ngày	Imofest	Chích dưới da
8 tháng	Tụ huyết trùng	Chích dưới da
8 tháng 7 ngày	Newcastle M	Chích dưới da
8 tháng 15 ngày	Imofest	Chích dưới da
C. Gà đẻ giống như trên và bổ sung thêm		
4 tháng	Gumbosoriffa	Chích dưới da
10 tháng	Gumbosoriffa	Chích dưới da

Câu 1 :Lịch chủng ngừa vaccin Newcastle M đối vớ gà đẻ thương phẩm là ;



A. 3 tháng 15 ngày và 8 tháng 7 ngày.



B. 4 tháng 7 ngày và 8 tháng 15 ngày.



C. 3 tháng 7 ngày và 8 tháng 15 ngày.



D. 2 tháng 7 ngày và 8 tháng 7 ngày.



Hết rồi ..Bạch học rồi !



Làm lại Đáp án



Câu 2: Đối với gà nuôi lấy trứng thì bao nhiêu lâu tái chủng Newcatle M?



A. 5 tuần.



B. 7 tuần.



C. 8 tuần.



D. 10 tuần.



Hết rồi ..Bạc chọn đúng rồi !



Làm lại



Đáp án



Câu 3: trong khẩu phần thức ăn cung cấp cho vật nuôi, tỉ lệ sau đây dành cho gà loại nào ?

HIỆU QUẢ CAO

NS-810

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

- Năng lượng trao đổi	(kcal/kg) :	2870
- Đạm tối thiểu	% :	17,0
- Xơ tối đa	% :	4,5
- Béo tối thiểu	% :	3,2
- Canxi trong khoảng	% :	3,5 - 4,2
- Phốt pho tối thiểu	% :	0,66
- Muối trong khoảng	% :	0,35 - 0,45
- Lysine tổng số tối thiểu	% :	0,8
- Methionin+Cystin tổng số tối thiểu	% :	0,65
- Độ ẩm tối đa	% :	13,0

Không có kháng sinh

Không có hoóc môn hoặc kháng hoóc môn.

NGUYÊN LIỆU

Ngô, tấm, cám, bột cá, khô đỗ
đỗ tằm và premix vitamin khoáng,...



A. Gà thịt tuần thứ 8 trở đi.



C. Gà thịt từ 18 – 42 ngày.



B. Gà con từ 1 -18 ngày.



D. Gà đẻ trứng.



Hết rồi ..Bạc cho nó đi rồi !



Làm lại Đáp án



Câu 4: Dựa vào bảng thông tin dưới đây , hãy chọn phương án nổi thông tin giữa hai cột phù hợp nhất :

(a) chất độc là những chất dùng liều nhỏ đã có thể gây rối loạn cho cơ thể hoặc làm thú chết .	(1) Strychine với liều nhỏ hợp lý là thuốc bổ nhưng liều lớn lại là thuốc độc
(b) Thuốc độc bảng A	(2) Nhãn hiệu thường in chữ màu xanh
(c) thuốc độc bảng B	(3) In bằng mực <u>đen</u> , có dòng chữ “ không dùng quá liều qui định “
(d) thuốc độc bảng C	(4) In bằng mực <u>đỏ</u> , có dòng chữ “Không dùng quá liều qui định”.



A. (a)-(3); (b) –(2);
(c)-(1);(d)- (4)



C. (a)-(4); (b) –(2);
(c)-(1); (d)- (3)



B. (a)-(1); (b) –
(3); (c)-(4);(d)- (2)



D. (a)-(4); (b) –(1);
(c)-(3); (d)- (2)



Hé hé ..Bà Bạch học đúng rồi !



Làm lại Đáp án



Câu 5: Cho các khẩu phần ăn sau :

- 80% chất đường bột , 12 % chất đạm , 3% chất béo, 2 % chất khoáng , 3 % vitamin

- 81% chất đường bột , 12 % chất đạm , 3% chất béo, 2 % chất khoáng , 2 % vitamin

- 77% chất đường bột , 12 % chất đạm , 6% chất béo, 2 % chất khoáng , 3 % vitamin

- 74% chất đường bột , 12 % chất đạm , 3% chất béo, 8 % chất khoáng , 3 % vitamin

- 79% chất đường bột , 12 % chất đạm , 5% chất béo, 2 % chất khoáng , 2 % vitamin

Trong các khẩu phần ăn trên có bao nhiêu khẩu phần ăn hợp lý .?




A. 2



B. 3



C. 4



D. 5



Hết rồi ..Bạch học rồi !



Làm lại Đáp án



Câu 6: Khi chọn gà mái đẻ, điều nào không phù hợp?



A. Xương hậu môn và xương ức cách nhau 4 cm.



B. Hông rộng, bụng to, mềm.



C. 2 xương hậu môn cách nhau 3 cm.



D. Lông mượt, mỏng mềm đỏ tươi.



Hết rồi ..Bạc chọn đúng rồi !



Làm lại Đáp án

